



PROVA SCRITTA

SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI INF/22

13 Ottobre 2022

Aula Formazione FTSA

Via Piave 40 Poggibonsi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 45 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - o risposta corretta = 1 punto
 - o mancata risposta o risposta errata = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1 FATTORI PIÙ IMPORTANTI ASSOCIATI ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA SONO:

- Età del paziente e stato neurologico A
- Luogo del ricovero, età e stato neurologico del paziente B
- Utilizzo degli antibiotici e antitumorali ed età del paziente C
- Durata del ricovero, utilizzo di antibiotici, utilizzo di device invasivi D

2 CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO:

- Sono la stessa cosa A
- Non sono sinonimi B
- Non si usano attualmente in Italia C
- Sono vietati per la violazione della privacy D

3 LA TOLLERANZA FARMACOLOGICA È:

- La necessità di aumentare progressivamente le dosi per ottenere lo stesso effetto che all'inizio del trattamento si osserva con dosi minori di farmaco A
- La possibilità di non dovere diminuire le dosi per ottenere un determinato effetto B
- La necessità di mantenere le stesse dosi per avere sempre lo stesso effetto C
- La necessità di diminuire progressivamente le dosi per avere effetti minori D

4 QUALE TRA LE SEGUENTI È LA DEFINIZIONE CORRETTA DI BRONCHIECTASIE?

- Restringimenti irreversibile del lume dei bronchi A
- Dilatazioni abnormi ed irreversibili di un tratto dell'albero bronchiale B
- Dilatazioni reversibili di un tratto dell'albero bronchiale C
- Di infezioni croniche o ricorrenti dell'apparato respiratorio D

5 NELLA GERIATRIC DEPRESSION SCALE A 30 ITEMS, LA DEPRESSIONE LIEVE È:

-
- tra 5 - 9
 - tra 10-19
 - tra 10-21
 - < 21

A
B
C
D

6 UN AGO 22 GAUGE RISPETTO A UN AGO 18 GAUGE È:

- Più grande
- Più piccolo
- Di materiale diverso
- Delle stesse dimensioni ma con filettatura diversa

A
B
C
D

7 GLI INDICATORI DELLA SCALA DI BRADEN SONO:

- Incontinenza, secchezza cutanea, umidità cutanea, frizione e scivolamento
- Percezione sensoriale, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento.
- Secchezza cutanea, percezione sensoriale, stato funzionale, nutrizionale, frizione e scivolamento
- Umidità, autonomia, nutrizione, stato funzionale, frizione e scivolamento

8 IL PROBLEM SOLVING È

- Il piano di assistenza infermieristica
- Il processo di assistenza infermieristica
- Un metodo scientifico per l'assistenza infermieristica
- Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi

9 I LEA IN ITALIA SONO ENTRATI PER LA PRIMA VOLTA IN VIGORE NEL:

- 1989
- 1999
- 2016
- 2022

10 LE VIE DI ELIMINAZIONE DEGLI AGENTI PATOGENI SONO:

- Via cutanea, ematica, oro-fecale, genito-urinaria, aerea
- Cutanea, ematica, transplacentare, gastro-intestinale, aerea
- Orale, oro-fecale, transplacentare, ematica, gastro-intestinale
- Oro-fecale, genito-urinaria, aerea, cutanea, linfatica

11 LA FEBBRE PUÒ ESSERE:

- Continua, intermittente, ricorrente
- Continua, intermittente, remittente, ricorrente

-
- Continua o intermittente
 - Nessuna delle precedenti

12 I CATETERI VESCICALI TEMPORANEI SONO:

- Levin, Einhors, Faucher
- Foley, Pezzer, Couvelier
- Nelaton, Tieneman, Mercier
- Nessuna risposta è corretta

13 OGNI QUALVOLTA CHE VIENE CAMBIATA LA SACCA DI RACCOLTA DI UNA STOMIA, DEVE ESSERE PULITO LO STOMA E RIAPPLICATA UNA NUOVA SACCA. COME DEVE ESSERE PULITO LO STOMA?

- Con soluzione fisiologica
- Con acqua tiepida, sapone neutro e asciugare tamponando
- Con acqua ossigenata poi lavare con antisettico
- Con salviette morbide

 A B C D

14 COME È DEFINITA LA CONTENZIONE NEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFERMIERI?

- Un evento straordinario
- Un comportamento sanzionabile da parte dell'Ordine
- Una metodica abituale di accudimento
- Una scelta condivisibile da parte dell'infermiere

 A B C D

15 LO SFINTERE PILORICO È UN ANELLO MUSCOLARE CHE SEPARA:

- Lo stomaco dall'intestino crasso
- Lo stomaco dall'intestino tenue
- L'intestino tenue dal crasso
- L'esofago dallo stomaco

 A B C D

16 NELLA CURA DELLE LESIONI DA PRESSIONE È FONDAMENTALE E IRRINUNCIABILE:

- L'utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o aria
- L'applicazione di garze grasse sulla lesione
- La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile
- L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione

 A B C D

17 CON LA LEGGE N. 42 /1999 RECANTE “DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE”:

- È abolito il mansionario relativo alla professione di infermiere
- Sono introdotti i profili professionali delle professioni sanitarie non mediche
- Sono aboliti i mansionari relativi alle professioni di infermiere e infermiere generico
- Non viene abolito nessun mansionario

 A B C D**18 QUALE TRA I SEGUENTI È IL PIÙ TEMIBILE EFFETTO COLLATERALE DELLA PENICELLINA:**

- Effetto allergenico
- Effetto tossico a livello renale
- Effetto tossico a livello epatico
- Effetto tossico sull'apparato gastroenterico

 A B C D

19 LE INFEZIONI OSPEDALIERE MAGGIORMENTE RICONTRATE NEI NOSOCOMI ITALIANI SECONDO GLI ULTIMI DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SONO LE:

- Infezioni della ferita chirurgica
- Infezioni delle vie respiratorie
- Infezioni del tratto urinario
- Nessuna delle precedenti

 A B C D

20 NELL'ADULTO LE SEDI PREFERENZIALI PER L'ESECUZIONE DI UN EGA SONO NELL'ORDINE:

- Arteria Radiale, omerale, femorale
- Arteria Radiale, omerale
- Arteria Radiale, femorale, omerale
- Arteria Omerale, radiale, femorale

 A B C D

21 LA RITENZIONE URINARIA È:

- Sensazione di bruciore durante la minzione
- Produzione di urine <500 ml/24 ore
- Mancata produzione di urine
- Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

 A B C D

22 LA DIAGNOSI INFERMIERISTICA REALE È COMPOSTA DA:

- Problema, cause, segni e sintomi
- Bisogno, problema, segni e sintomi
- Bisogno, segni e sintomi
- Bisogno, segni, interventi

 A B C D

23 IL PH DEL SUCCO GASTRICO È COMPRESO TRA:

- 7 e 8

 A

- 1 e 2

- 5 e 6

- 4 e 5

24 LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTING SANITARIO È PREVISTA DAL:

- DPR 303/1956

- D leg 101/2020

- DPR 1124/1965

- D leg 81/2008

25 LA DEFINIZIONE DI EMOTTISI È:

- Emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie
- Emissione di sangue proveniente dalle vie digestive
- Emissione di sangue con le feci
- Emissione di sangue dal naso

 A B C D**26 LA TECNICA CORRETTA DI ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE PREVEDE:**

- Durata minore di 15 secondi, aspirazione intermittente, non in fase di inserzione sondino
- Durata minore di 15 secondi, aspirazione continua, non in fase di inserzione sondino
- Durata variabile in base alla quantità di secrezioni da rimuovere
- Durata minore di 15 secondi, aspirazione intermedia, indifferentemente in fase di inserzione o di retrazione sondino

 A B C D**27 IN UNA PERSONA DISFAGICA, DURANTE IL PASTO, È INDICATO CONTROLLARE LA COMPARSA DI:**

- Pallore
- Voce gorgogliante
- Tosse
- Tachicardia

 A B C D**28 LA DEFINIZIONE DI RISK MANAGEMENT È:**

- Studio epidemiologico sperimentale con valutazione d'efficacia di un intervento preventivo
- Processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
- Informazione ed educazione della popolazione su problemi sanitari
- Identificazione del livello di rischio, eliminazione o riduzione dell'esposizione e continuo monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo

 A B C D**29 UN VACCINO È COSTITUITO DA:**

- Virus
- Antigeni

 A B

▪ Anticorpi

▪ Proteine

30 PER QUALE VIA AVVIENE LA TRASMISSIONE DEL VIRUS HBV:

▪ Aerea, sessuale

▪ Aerea, verticale

▪ Parenterale, sessuale, verticale

▪ Parenterale, verticale, droplet