



PROVA SCRITTA

SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI INF/18

12 Aprile 2018

Aula Formazione FTSA

Via Piave 40 Poggibonsi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 40 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - risposta corretta = 1 punto
 - risposta sbagliata = -0.25 punti
 - mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1 Al personale di supporto è possibile:

- Delegare attività o compiti
- Attribuire compiti
- Delegare compiti e valutazioni delle attività svolte
- Attribuire compiti e valutazione delle attività svolte

A
B
C
D

2 Si ha una fiala di gentamicina da 40mg/ml. Volendone somministrare al paziente 16 mg, quanti ml si devono impiegare?

- 0.5 ml
- 0.2 ml
- 0.3 ml
- 0.4 ml

A
B
C
D

3 Ordinare correttamente le operazioni da eseguire per la broncoaspirazione in un paziente cosciente adulto e tracheostomizzato:

- 1- Indossare i dispositivi di protezione con un guanto sterile sulla mano dominante e con questa prendere il catetere di aspirazione;
- 2- Far assumere al paziente la posizione semi-fowler e accendere l'aspiratore con depressione da 80 a 120 mmHg;
- 3- Identificare il bisogno dell'assistito, lavarsi le mani, spiegare all'assistito la procedura;
- 4- Eliminare il materiale contaminato negli appositi contenitori e lavarsi le mani;
- 5- Lubrificare il catetere di aspirazione e inserire il catetere attraverso la cannula tracheostomica ad aspirazione chiusa e farlo avanzare fino a quando incontra una resistenza;
- 6- Applicare l'aspirazione e iniziare ad estrarre il catetere per un massimo di 5/10 secondi controllando lo stato del paziente;
- 7- Iperossigenare il paziente per 30 secondi;
- 8- Aprire e preparare il materiale sterile per l'aspirazione;

- 3-8-2-1-7-5-6-4
- 3-7-8-1-2-5-6-4
- 3-2-8-1-5-6-7-4
- 3-2-8-7-1-5-6-4

A
B
C
D

4 In una crisi epilettica convulsiva generalizzata lo stato di coscienza è:

- conservato
- assente
- ridotto
- Obnubilato

A
B
C
D

5 Un infermiere/ostetrica/o può somministrare un placebo ad un paziente?

- Mai A
- Solo su richiesta del paziente B
- Solo a pazienti psichiatrici C
- Solo su indicazione medica D

6 La schizofrenia generalmente insorge:

- Durante l'infanzia A
- Nella prima età adulta B
- Durante l'adolescenza C
- Nessuna delle precedenti D

7 Quando un paziente in terapia con digitale presenta vomito è necessario:

- Avvisare subito il medico A
- Aspettare la successiva somministrazione B
- Aumentare l'apporto idrico C
- Somministrare un antiemetico D

8 L'infermiere/ostetrica/o incorre nel reato di lesioni personali:

- Quando opera senza la prescrizione del medico A
- Solo quando le commette intenzionalmente B
- Quando le commette senza intenzione C
- Le commette per negligenza, imprudenza D

9 Negli anziani la polmonite è la principale causa:

- Di morte A
- Di inabilità B
- Di morte da malattie infettive C
- Di disabilità D

10 La presenza della triade sintomatologica costituita da dolore addominale, diarrea e fibrillazione atriale, fa pensare a:

- Una colite ulcerosa A
- Un infarto intestinale B
- Una enterocolite necrotizzante C
- Una cisti da echinococco D

11 La definizione di emottisi è:

- Emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie
- Emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- Emissione di sangue con il vomito
- Emissione di sangue dal naso

 A B C D**12 La clearance della creatinina deve essere effettuata**

- Solo su un campione di urine delle 24 ore
- Su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore
- Su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 12 ore
- Su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 8 ore

 A B C D**13 Nella "aprassia ideativa" il disturbo fondamentale consiste:**

- Nel sostituire ai movimenti corretti che compongono un gesto, gesti automatici o incompleti o amorfi
- Nel non poter eseguire il movimento voluto
- Nell'insorgere di tremori nell'atto del movimento
- Nell'incapacità di eseguire nella giusta successione i movimenti che compongono un atto

 A B C D**14 La posizione di Fowler consente**

- L'esplorazione della prostata
- L'esecuzione del clistere evacuativo
- Una migliore funzionalità ventilatoria
- L'accertamento delle pervietà delle vie aeree

 A B C D**15 Le epilessie sono malattie caratterizzate da:**

- Progressivo deterioramento delle funzioni intellettive
- Improvvisa insorgenza di deficit neurologici irreversibili
- Accessi parossistici ricorrenti
- Perdita di coscienza

 A B C D**16 La disuria è una minzione:**

- Che avviene senza stimolo di urinare
- Frequente, di poche gocce di urina
- Dolorosa ed ematica
- Dolorosa

 A B C D

17 La lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico si caratterizza per :

- Fondo della lesione non granuleggiante A
- Localizzazione dorsale o perimalleolare B
- Bordo dell'ulcera ipercheratosico C
- Scarsa tendenza alla riparazione se adeguatamente scarificata D

18 Il dolore in corrispondenza dell'ipocondrio destro con contrattura di difesa e positività del segno di Murphy deve far pensare a :

- Colecistite acuta A
- Appendicite B
- Colica renale C
- Cisti ovarica torta D

19 Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per uniformare la pratica clinica ai risultati della ricerca è:

- L'istruzione operativa A
- Il protocollo B
- La linea guida C
- La procedura D

20 L'affermazione corretta è:

- L'emergenza è una condizione statisticamente più frequente dell'urgenza che richiede un trattamento tempestivo ed appropriato A
- L'emergenza è una condizione statisticamente meno frequente dell'urgenza che richiede un trattamento tempestivo ed appropriato B
- L'emergenza è una condizione statisticamente più frequente dell'urgenza che richiede un trattamento appropriato ma non tempestivo C
- L'emergenza e l'urgenza sono condizioni sovrapponibili per frequenza e tempestività di trattamento D

21 Le fasi del Nursing psichiatrico secondo Peplau sono:

- Orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione A
- Raccolta dati, identificazione, formulazione degli obiettivi, valutazione B
- Orientamento, risoluzione C
- Identificazione, utilizzazione, risoluzione D

22 Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie è :

- Il metodo NIOSH
- Il metodo MAPO
- La valutazione del numero dei posti letto
- La valutazione della pianta organica

 A B C D

23 Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di "rilevazione della saturazione di ossigeno":

1. Attaccare il cavo del sensore alla spina di collegamento nell'ossimetro.
2. Pulire il sito con disinfettante prima di applicare il sensore.
3. Lavarsi le mani e osservare le indicazioni per il controllo delle infezioni.
4. Trascrivere i valori della misurazione di ossigeno nella documentazione clinica del paziente ad intervalli di tempo indicati.
5. Ispezionare e/o sollevare o cambiare l'ubicazione del sensore adesivo situato sul dito del piede o della mano ogni 4 ore, in caso di un sensore elastico ogni 2 ore.
6. Rimuovere le unghie posticce e lo smalto in quanto possono interferire nella misurazione.
7. Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può collaborare.
8. Scegliere un sensore adatto al peso e alla taglia del paziente e per la localizzazione desiderata.
9. Assicurarsi che la luce o l'onda sullo schermo dell'ossimetro fluttui ad ogni pulsazione e rifletta il volume o la forza del polso.
10. Assicurarsi che gli allarmi sonori e visivi siano accesi prima di allontanarsi dal paziente.

- 3-8-2-7-1-9-6-5-10-4
- 8-2-3-7-6-1-9-5-10-4
- 3-7-8-9-2-1-10-5-4-6
- 7-3-8-2-6-1-9-10-5-4-

 A B C D

24 Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:

- Problemi, interventi, valutazione
- Problemi, obiettivi, interventi
- Problemi, obiettivi, interventi, valutazione
- Interventi, valutazione

 A B C D

25 Il protocollo è:

- La formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali l'infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo criteri di scientificità ed appropriatezza A
- La formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali l'infermiere organizza il suo lavoro nell'unità operativa B
- La formalizzazione dell'insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali l'infermiere eroga le sue prestazioni C
- E' una successione logica di azioni, espressa in forma scritta, avente lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza D

26 La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata:

- V. Henderson A
- B. Peplau B
- M. Rogers C
- D. Orem D

27 La definizione di stato di salute come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" è :

- Del Ministero della Sanità A
- Dell'Istituto Superiore di Sanità B
- Dell'Organizzazione delle Nazioni Unite C
- Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità D

28 La differenza fondamentale tra ADL e IADL, nella valutazione di un soggetto a domicilio, consiste nel:

- Misurare aspetti della relazione sociale e interpersonale A
- Considerare abilità anche strumentali a quelle di vita quotidiana B
- Considerare anche la diagnosi e incidenti pregressi C
- Considerare anche aspetti dello stato di salute e di malattia D

29 La febbre remittente è caratterizzata da:

- Oscillazioni quotidiane minori di 1° C in assenza di defervescenza A
- Oscillazioni quotidiane maggiori di un 1° C in assenza di defervescenza B
- Oscillazioni quotidiane con fasi di defervescenza C
- Aumento graduale della temperatura seguito da un altrettanto graduale defervescenza D

30 Il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere e dell'ostetrica /o è regolamentato dai contenuti del

- Profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post-base A
- Codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post-base, L. 341/1990 B
- Profilo professionale, ordinamento didattico di base e formazione post-base, D.M. 509/1999 C
- Profilo professionale, codice deontologico e L. 251/2000 D