



**Riportare il numero indicato in basso a destra
del foglio dati anagrafici, nel riquadro a fianco**

=>

N°

PROVA TECNICO PRATICA

SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI INF/17

26 Settembre 2017

Aula Formazione via Piave, 40 Poggibonsi (SI)

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 40 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - o risposta corretta = 1 punto
 - o risposta sbagliata = -0.25 punti
 - o mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1 Quale tra seguenti scale di valutazione è indicata per individuare i principali fattori di rischio per le lesioni da decubito?

- Tinetti ☐ A
- Braden ☒ B
- Conley ☐ C
- Barthel ☐ D

2 I pazienti che seguono una tp con anticoagulanti dovranno escludere dalla loro dieta gli alimenti ricchi di quali delle seguenti vitamine?

- Vit A ☐ A
- Vit K ☒ B
- Vit B12 ☐ C
- Tutte le precedenti risposte ☐ D

3 Con il termine “Afasia” si intende:

- La perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio ☒ A
- Disturbo motorio del linguaggio caratterizzato da una scarsa capacità di articolare dei fonemi ☐ B
- Disturbo temporaneo o permanente caratterizzato dall’incapacità totale di produrre suoni con la voce ☐ C
- Incapacità di combinare suoni per emettere un discorso intelligibile ☐ D

4 Quale delle seguenti affermazioni sulla disfagia non è corretta?

- E’ un’alterazione del meccanismo che consente di deglutire ☐ A
- Può avere conseguenze gravi ☐ B
- Uno dei test più usati per la diagnosi è il Test del bolo d’acqua ☐ C
- La temperature dei cibi deve essere il più possibile vicina a quella corporea (37°C) al fine di facilitare la deglutizione ☒ D

5 L’infusione dei nutrienti può essere praticata:

- In pompa peristaltica ☐ A
- A caduta ☐ B
- A boli ☐ C
- tutte le precedenti risposte sono corrette ☒ D

6 Quale tra queste non rientra tra le principali D.I. in pz affetto da scompenso cardiaco?

- Intolleranza all'attività
- Alterata perfusione tissutale periferica
- Liberazione inefficace delle vie aeree
- Rischio elevato di eccesso di volume di liquidi

A

B

C

D

7 Quale tra queste non è una caratteristica della schizofrenia?

- Allucinazioni
- Deliri
- Pensieri disorganizzati
- Disturbi della personalità multipla

A

B

C

D

8 La sindrome di Asperger è:

- Affine all'autismo
- Affine alla sindrome di Down
- Affine a disturbi di comprensione
- Affine a disturbi dell'intelligenza

A

B

C

D

9 Se in un flacone di soluzione fisiologica da 500 ml, si deve aggiungere 45 mEq di potassio cloruro (KCL), avvalendosi di fiale da 10 ml, contenenti una concentrazione di 3 mEq/ml quanti ml si dovranno aspirare?

- 30 ml
- 40 ml
- 25 ml
- 15 ml

A

B

C

D

10 Quale dei seguenti compiti non può essere delegato al personale di supporto?

- Rilevazione saturazione di ossigeno (ossimetro da polso)
- Rilevazione della pressione arteriosa
- Rilevazione del polso apicale
- Rilevazione del polso periferico

A

B

C

D

11 Un infermiere sta prestando servizio presso una struttura sanitaria per lungodegenza e sta pianificando di delegare la raccolta di un campione al personale di supporto. Quale delle seguenti operazioni potrebbe delegare?

- Coadiuvare il medico nella raccolta di un campione di fluido cerebrospinale
- raccogliere un campione da una ferita per la coltura e l'antibiogramma
- Raccogliere un campione di sangue venoso
- Raccogliere un campione di urina per esami di routine

A

B

C

D

12 Un infermiere che lavora presso una struttura per lungodegenze deve assistere un paziente che necessita di tre persone per il trasferimento. L'unità di cura è oberata di lavoro e tutti in quel momento sono impegnati. Adesso l'infermiere deve aiutare il paziente a tornare a letto, poiché non si sente bene e vuole riposare. L'infermiere dovrebbe:

- Aiutare il paziente a tornare a letto senza assistenza ☐
- Incoraggiare il paziente ad aspettare finché si rendano disponibili gli assistenti necessari ☐
- Trasferire il paziente con l'assistenza di una sola persona ☐
- Utilizzare il sollevatore idraulico per trasferire il paziente con l'assistenza di un'altra persona ☒

13 Un infermiere ha accidentalmente rovesciato una brocca d'acqua nel corridoio del reparto. Il primo intervento che l'infermiere dovrebbe attuare per evitare le cadute è:

- Andare a prendere degli asciugamani o qualcos'altro per asciugare ☐
- Restare dov'è avvenuto l'incidente e mandare qualcun altro a chiamare il personale delle pulizie per fare asciugare ☒
- Chiamare il personale delle pulizie dalla postazione infermieristica per asciugare ☐
- Riempire di nuovo la brocca d'acqua e portarla al paziente, quindi tornare ad asciugare ☐

14 Un infermiere si sta preparando a somministrare un farmaco per via intramuscolare. Il farmaco è molto denso e viscoso, per cui viene utilizzato un ago da:

- 18 gauge ☐
- 20 gauge ☒
- 22 gauge ☐
- 24 gauge ☐

15 Un infermiere si sta preparando a iniziare la somministrazione di una terapia endovenosa. Il medico ha prescritto infusione continua di soluzione fisiologica allo 0.9% a una velocità di 80ml/h. l'infermiere si procura la soluzione e un deflussore che eroga 10 gocce per ml. Quante gocce al minuto dovrebbe impostare l'infermiere per somministrare la quantità prescritta?

- 20 gtt ☐
- 14 gtt ☒
- 18 gtt ☐
- 11 gtt ☐

16 un infermiere sta assistendo un paziente con ipertrofia prostatica e ritenzione urinaria. Quale dei seguenti cateteri rappresenta la scelta migliore per questo paziente?

- Catetere Foley ☐
- Catetere Nelaton ☐
- Catetere a condom ☐
- Catetere Mercier ☒

17 Un infermiere deve avvertire il medico se un paziente con catetere a permanenza produce un totale di:

- 25 ml di urina durante la prima ora, 35 ml durante la seconda, 27 ml durante la terza
- 25 ml di urina durante la prima ora, 30 ml durante la seconda, 35 ml durante la terza
- 35 ml di urina durante la prima ora, 30 ml durante la seconda, 35 ml durante la terza
- 45 ml di urina durante la prima ora, 50 ml durante la seconda, 35 ml durante la terza

☒ A
☐ B
☐ C
☐ D

18 Un infermiere sta assistendo un paziente a rischio moderato di trombosi venosa profonda o embolia polmonare e sa che il paziente necessita di:

- Calze antitrombo
- Un dispositivo di compressione graduale
- Calze antitrombo e un dispositivo a compressione graduale
- Calze antitrombo , un dispositivo a compressione graduale e terapia anticoagulante

☐ A
☐ B
☒ C
☐ D

19 Quale delle seguenti responsabilità relative all'ossigeno terapia può essere delegata dall'infermiere al personale di supporto?

- Avvio dell'ossigenoterapia
- Determinazione della risposta del paziente alla terapia
- Misurazione della saturazione di ossigeno
- Modifica della velocità di flusso dell'ossigeno sulla base della risposta del paziente alla terapia

☐ A
☐ B
☒ C
☐ D

20 Un paziente affetto da polmonite è sottoposto a ossigenoterapia a causa di una saturazione di ossigeno pari all'85%. L'infermiere del turno precedente riferisce che, dopo aver iniziato l'ossigenoterapia a 4L/min, la saturazione di ossigeno del paziente è pari al 94%. L'infermiere sta valutando il paziente all'inizio del turno. Quale dei seguenti risultati dovrebbe riferire immediatamente al medico?

- Saturazione di ossigeno pari al 98% e frequenza respiratoria pari a 22 respiri minuto
- Saturazione di ossigeno pari al 94% e frequenza respiratoria pari a 20 respiri minuto
- Saturazione di ossigeno pari al 88% e frequenza respiratoria pari a 26 respiri minuto
- Saturazione di ossigeno pari al 84% e frequenza respiratoria pari a 28 respiri minuto

☐ A
☐ B
☐ C
☒ D

21 Un paziente è stato trovato privo di polso e di respiro. È stato chiamato il 118. Quale azione dovrebbe effettuare l'infermiere mentre aspetta l'arrivo del 118?

- Prendere la cartella clinica e la scheda della terapia del paziente
- Procurarsi il carrello delle emergenze
- Avvisare il medico del paziente
- Effettuare la RCP

☐ A
☐ B
☐ C
☒ D

22 Quale delle seguenti operazioni potrebbe essere delegata dall'infermiere al personale di supporto?

- Medicazione post operatoria sterile
- Medicazione asciutte per una ferita cronica pulita
- Irrigazione delle ferite
- Impacco delle ferite

☐ A☒ B☐ C☐ D

23 Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono:

- raccolta dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attivazione degli interventi, valutazione
- identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli interventi, valutazione, formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati

☒ A☐ B☐ C☐ D

24 Quale delle quattro parole sotto riportate non va d'accordo con le altre

- ulna
- perone
- tibia
- rotula

☒ A☐ B☐ C☐ D

25 Se ieri era il dopodomani di giovedì, quale giorno sarà ieri di dopodomani

- lunedì
- domenica
- sabato
- mercoledì

☒ A☐ B☐ C☐ D

26 Gli obiettivi assistenziali devono essere formulati:

- come descrizione del comportamento atteso con l'indicatore di misura e l'unità di tempo di riferimento
- come risultato generale per orientare e guidare tutta l'équipe infermieristica
- come problema congruente con la diagnosi infermieristica
- come livello di qualità totale

☒ A☐ B☐ C☐ D

27 Secondo V. Henderson l'infermiere è:

- consulente, aiutante del paziente
- aiutante, sostituto ed educatore del paziente
- consigliere competente, esperto del paziente
- sostituto, aiutante, partner del paziente

☐ A☐ B☐ C☒ D

28 entro quale intensità può variare il dolore?

- dallo stato confusionale al vero e proprio delirio
- dal lieve fastidio alla grave iperalgesia
- dal lieve fastidio al dolore cronico
- dipende dal grado di sopportazione

☐ A☒ B☐ C☐ D

29 Cosa rappresenta la cartella clinica?

- la diagnosi definitiva e prognosi
- il documento dove riportare generalità del paziente e dei suoi familiari e anamnesi delle malattie pregresse
- il curriculum del malato in quel ricovero
- l'assicurazione del malato contro eventuali incidenti ed infortuni

☐ A☐ B☒ C☐ D

30 Che cosa è la diagnosi infermieristica?

- in giudizio clinico riguardante gli interventi infermieristici
- un giudizio clinico riguardante la terapia
- un giudizio clinico riguardante lo stato patologico della persona assistita
- il giudizio clinico riguardante i problemi attuali e potenziali della persona assistita

☐ A☐ B☐ C☒ D